# LE AZIENDE INFORMANO

## FLUGENIL DETERGENTE

### Calendula, ribes e aloe vera a pH fisiologico

***Per cute e mucose delicate***

**Flugenil detergente** previene e contrasta l'insorgere di arrossamenti, secchezza, prurito, rispettando la naturale idratazione della pelle e contrastando l'irritazione di pelle e mucose delicate.

Si sostituisce ai detergenti di tipo tradizionale in tutte le situazioni in cui si renda necessaria un'azione estremamente delicata per la presenza di un'epidermide particolarmente sensibile e irritabile.

Privo di SLES, SLS, derivati del petrolio, parabeni, allergeni del profumo, coloranti, alcol, è formulato con tensioattivi estremamente dolci, ad alta compatibilità cutanea, ottenuti per condensazione da olio di cocco e zucchero.

È particolarmente indicato per la detergenza delicata di pelli irritate (acneiche), sensibili e allergiche, con barriera lipidica ridotta (dermatiti atopiche). È anche indicato per l'igiene intima in menopausa.

Utilizzare **Flugenil detergente** quotidianamente come un normale detergente, emulsionando e risciacquando accuratamente. *Formulato per uso frequente.*

**Formulazione ultradelicata con ingredienti naturali**

*Testato dermatologicamente senza derivati del petrolio, coloranti, parabeni, alcol, SLES/SLS.*

In farmacia

**Flacone da 150 ml**




Sakura Italia Srl
www.sakuraitalia.it


# *Quiz di autovalutazione*

La lettura di una Rivista medica è apprendimento attivo o passivo? Può essere l'uno o l'altro. PQRST è una ricetta per una lettura attiva. P STA PER PREVIEW (prelettura veloce, uno sguardo d'insieme al testo). Q STA PER QUESTION (cosa so già? cosa vorrei sapere?). R STA PER READ (lettura attenta). S STA PER STATE (bilancio delle conoscenze DOPO la lettura). T STA PER TEST (controllo, quiz). Vi proponiamo di testarvi con questi quiz PRIMA E DOPO. Se rispondete a 11 (70%), siete bravi; se rispondete a tutti, vuol dire che i quiz sono troppo facili, almeno per voi; se, a meno di 8 (50%), sono troppo difficili. Oppure dovete rimettere in discussione le vostre conoscenze.

AGGIORNAMENTO - MIOCARDITE

**1. La miocardite riguarda più frequentemente:**
**a)** I bambini in età scolare (6-10 anni); **b)** Quasi esclusivamente gli adolescenti; **c)** Ha un picco di incidenza bimodale: primi mesi di vita ed età adolescenziale.

**2. La miocardite come sintomatologia può caratterizzarsi nel bambino piccolo con segni aspecifici, quali astenia, ipomobilità, vomito**
Vero/Falso

**3. Nel laboratorio della miocardite l'innalzamento delle AST non associato all'aumento delle ALT risulta essere tra gli esami più suggestivi. In quali percentuali di pazienti pediatrici con miocardite si riscontra?**
**a)** 79-92%; **b)** 50-60%; **c)** 40-50%.

**4. La troponina nei bambini con miocardite ha non solo una sensibilità limitata ma anche una specificità relativamente non alta (83%). Può inoltre essere falsamente positiva in caso di:**
**a)** Iperbilirubinemia; **b)** Emolisi; **c)** Presenza di macroenzimi, anticorpi eterofili e fattore reumatoide; **d)** Tutti i precedenti; **e)** Tutti i precedenti tranne uno.

**5. Nelle forme di miocardite croniche recidivanti che riguardano più frequentemente l'adolescente la terapia immunosoppressiva deve essere sempre eseguita**
Vero/Falso

PROBLEMI CORRENTI
DOLORE DA VENIPUNTURA

**6. La pomata anestetica EMLA che si usa per la prevenzione del dolore da venipuntura agisce e ha l'effetto massimo anestetico dopo quanti minuti dalla sua applicazione?**
**a)** 30-45; **b)** 45-60; **c)** 60-90.

**7. L'applicazione dell'EMLA è in grado di prevenire il dolore ma influisce in maniera negativa sull'esito della procedura di venipuntura o incannulamento venoso**
Vero/Falso

**8. In uno studio italiano su bambini in età prescolare è stata messa a confronto l'efficacia della distrazione del bambino fatta dal genitore vs guardare la TV. Quale funziona di più?**
**a)** Non ci sarebbe differenza; **b)** Guardare la TV; **c)** La distrazione fatta dal genitore.

RICERCA
I TEST ALLEGOLOGICI NELLA DIAGNOSI DI IPERSENSIBILITÀ ALL'AMOXICILLINA

**9. Nella diagnosi di ipersensibilità non immediata all'amoxicillina i test cutanei (prick test, intradermoreazione) e la ricerca delle IgE sieriche rimangono il gold standard per la diagnosi**
Vero/Falso

**10. Il test di provocazione orale con amoxicillina senza preventivo test cutaneo o sierico può essere considerato una procedura praticabile e sicura in bambini con reazioni lievi non immediate**
Vero/Falso

**11. Le reazioni cliniche più comuni associate all'amoxicillina sono:**
**a)** L'orticaria; **b)** Le eruzioni eritematose maculo-papulari non IgE mediate; **c)** Variano come incidenza a seconda dell'età.

DIGEST - FREQUENZA AL NIDO

**12. Due studi di tipo caso-controllo e una metanalisi dimostrerebbero che la frequenza al nido:**
**a)** Riduce il rischio di leucemia linfoblastica acuta; **b)** Aumenta il rischio; **c)** Non ha alcuna influenza.

**13. La frequenza al nido nel primo anno di vita aumenterebbe il rischio di insorgenza di diabete di tipo 1**
Vero/Falso

PAGINE ELETTRONICHE

**14. In un bambino febbrile la mancata risposta all'antipiretico (nella diminuzione significativa della temperatura) aumenta con ragionevole sicurezza la probabilità di essere in presenza di una malattia batterica grave**
Vero/Falso

DOMANDE E RISPOSTE

**15. Il nuovo protocollo per la diagnosi di celiachia della Società Europea di Gastroenterologia Pediatrica prevede che:**
**a)** La biopsia intestinale debba essere eseguita in tutti i casi; **b)** La biopsia intestinale possa essere evitata in quelli che hanno i sintomi suggestivi di malattia celiaca; **c)** La biopsia intestinale non sia più indispensabile nei bambini che presentano l'insieme di: sintomi tipici; positività ad alto titolo degli anticorpi antitransglutaminasi IgA; positività per antiendomisio (EMA); presenza della genetica associata alla celiachia (HLA DQ2/ DQ8).

## *Risposte*

AGGIORNAMENTO 1=c; 2=Vero; 3=a; 4=d; 5=Falso; PROBLEMI CORRENTI 6=c; 7=Falso; 8=b; RICERCA 9=Falso; 10=Vero; 11=b; DIGEST 12=a; 13=Falso; PAGINE ELETTRONICHE 14=Falso; DOMANDE E RISPOSTE 15=c.