

MeB – Pagine Elettroniche

Volume VI

Dicembre 2003

numero 10

CASO CLINICO INTERATTIVO

Un lattante con pianto, anemia e bassi valori di immunoglobuline

Marzia Lazzerini

Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

L'associazione tra IPLV e ipogamma non è nuova. Le possibili cause sono almeno tre:

- 1) Perdite
- 2) Malassorbimento
- 3) Deficit immunitario primario predisponente

I possibili meccanismi descritti sono:

- esofagite, gastrite — la lesione della mucosa — anemizzazione, perdita di proteine (dosabili anche nell'aspirato gastrico o nelle feci -dosaggio dell' alfa1 antitripsina).
- Ileite, colite — malassorbimento — ridotto assorbimento di nutrienti (generalmente diminuisce prima l'albumina delle immunoglobuline).
- Deficit di IgA di mucosa — alterata processazione dell'antigene a livello della mucosa gastroenterica — allergia
- Deficit altre classi di immunoglobuline — meccanismi non ben spiegati, probabilmente rientrano in disregolazione immunitaria più complessa a livello cellulare (linfocitario).

Nel caso di Martina persiste un deficit di tutte le classi di Ig, con normalità emocromo, che fare?

- attesa
- esami secondo livello