

MeB – Pagine Elettroniche

Volume VII

Febbraio 2004

numero 2

CASO CLINICO INTERATTIVO

Una dattilite bilaterale simmetrica

di M. Lazzerini

Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

1 | 2 | 3 | 4 | 5

I cardini della terapia degli episodi acuti di sequestro sono:

- Trasfusione: raccomandata in tutte le situazioni di anemia severa, e come terapia cronica di fondo per inibire la sintesi midollare di cellule “falcemizzanti”.
- Idratazione: raccomandata in tutte le linee guida, prevede l'idratazione come tentativo di ridurre la falcemizzazione.
- Antibiotico: nell'ipotesi spesso verosimile d'infezione batterica
- Antidolorifico

La piccola Eki è stata trasfusa in due giorni successivi con 300cc di emazie concentrate diluite in fisiologica (300cc).

Per quanto riguarda l'osteomielite è stata avviata terapia antibiotica iniettiva, principalmente mirata allo Stafilococco (teicoplanina, ma anche flucoxacillina o oxacillina) ed alla Salmonella (ceftriaxone).

Quali sono le misure di prevenzione e profilassi da attuare in caso di un bambino affetto da AF?

- non esiste nessuna misura utile
- antibioticoprofilassi
- sono sufficienti le vaccinazioni
- idratazione
- l'idratazione, le vaccinazioni, l'antibioticoprofilassi (giusta)