

MeB – Pagine Elettroniche

Volume VIII

Giugno 2005

numero 6

CASO CLINICO INTERATTIVO**Una ragazza con vomito ricorrente**

Patrizia Salierno, Isabella Giuseppin, Federico Marchetti

*Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Università di Trieste***Indirizzo per corrispondenza:** marchetti@burlo.trieste.it

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Esistono pochi studi sulla prevalenza della SVC, che sembra essere intorno a valori compresi tra 1.9% e 2.3% in una popolazione in età scolare. L'età media di comparsa dei primi sintomi è intorno ai 4-5 anni con persistenza sino alla adolescenza, anche se in alcuni casi l'insorgenza del sintomo avviene durante o addirittura dopo l'età adolescenziale. Non vi è differenza significativa tra maschi e femmine.

E' opinione comune far rientrare la SVC nel quadro più ampio della Sindrome Periodica che include altri fenomeni parossistici quali Dolori Addominali Ricorrenti (DAR), chinetosi, vertigini parossistiche benigne e l'emicrania.

LA DIAGNOSI Quale/i sono gli elementi più “importanti” ai fini diagnostici?

- Le indagini bioumorali
- Le indagini strumentali
- Sia le indagini bio-umoral che strumentali
- La storia clinica dettagliata