

MeB – Pagine Elettroniche

Volume XIV

Gennaio 2011

numero 1

IL COMMENTO**Trattamento degli spasmi affettivi**

Franco Panizon

*Dipartimento di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo,
Università di Trieste*

Il contributo¹ su un caso di spasmo affettivo pallido trattato con glicopirrolato, pubblicato su questo numero delle *Pagine Elettroniche*, è certamente interessante, anche in considerazione della relativa gravità e della relativa rarità della varietà “pallida”. Gli Autori non sembra abbiano preso in considerazione il “dovere” di dare ANCHE del ferro. È vero, come correttamente indicano, che la somministrazione di ferro è consigliata (noi diremmo obbligatoria, visto che dimezza statisticamente la prevalenza dell'evento², anche in bambini senza dimostrabile iposideremia) ai bambini con spasmi affettivi cianotici; tuttavia, questo è soltanto legato al fatto che la variante cianotica è di gran lunga più comune e pertanto suscettibile di sperimentazione clinica controllata. Ma poiché la causa scatenante “centrale” è probabilmente la stessa nelle due forme, la prudenza consiglierebbe di dare l'innocente ferro in tutti i casi.

Bibliografia

1. G. Monti, G. Barbato, E. Favaro, I. Bo, E. Zanetti, N. Carano. Spasmi respiratori affettivi di tipo pallido con asistolia: un caso trattato con glicopirrolato. *Medico e Bambino pagine elettroniche* 2011; 14(1)
2. F. Panizon. Iper-ecplexia, spasmi affettivi, ferro. *Medico e Bambino* 2010;29:593-594