

Paralisi cerebrale e disturbi dell'alimentazione: gli esami strumentali per la diagnosi

M. Lazzerini, S. Martelossi, F. Marchetti

Clinica Pediatrica, IRCCS Burlo Garofolo, Trieste

Indirizzo per corrispondenza: marzia_lazzerini@libero.it

Cerebral palsy and feeding disorders: instrumental diagnosis

Key words: Cerebral palsy, Feeding disorders, pH-metry, Gastroesophageal reflux, Pediatric instrumental diagnosis




Figura 6. Tracciato pH-metrico.

Result	Channel	Overall	Supine	Erect
Acid Exposure (pH)				
Total Duration (HH:MM)	pH	23.59	0.00	23.59
Acid Exposure Duration (HH:MM)	pH	2.45	0.00	2.45
Acid Exposure % Time	pH	11.5 [4.5]		11.5
Episode Analysis (pH)				
No. episodes	pH	60 [46.9]	0	60
Episode Duration (HH:MM)	pH	4.33	0.00	4.33
Longest Episode	pH	0.37 [0:20]	0.00	0.37
Symptom Index/Events (pH)				
Symptom Index % (%)	pH			
Deemeester and Johnson Score (pH)				
Total Score	pH	41.4 [14.7]		

pH-metria patologica con tempo di reflusso totale dell'11.5%.

(Il valore normale è solitamente definito al di sotto del 5% per i bambini di età >1 anno, come nel nostro caso).